

高雄市醫師公會
收 113.9.4日
文 字第1433號

檔 案：
保存年限：

中華民國醫師公會全國聯合會
西醫基層醫療服務審查執行會高屏分會 函

聯絡人：楊予婷
聯絡電話：07-2417938 傳真話：07-2414628
郵政信箱：80099 高雄新興郵局第 919 號信箱

(801)

高雄市前金區市中一路 225 號 4 樓
受文者：社團法人高雄市醫師公會

發文日期：中華民國 113 年 8 月 30 日
發文字號：(113)西醫基總高屏字第 057 號
速別：普通
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三、四

主旨：檢送 113 年第 2 季「透析前高風險腎臟病人使用 NSAIDs 藥量異常」院所醫師名單，請貴會協助輔導會員，使用此藥物應嚴加謹慎審視患者適宜性以減少腎功能惡化，詳如說明段，請 查照。

說明：

- 一、依據中華民國醫師公會全國聯合會西醫基層醫療服務審查執行會全醫基審字第 1130000073 號函辦理。
- 二、用藥異常之案件明細，健保署已透過各業務組 VPN 定期資訊回饋院所自主管理。
- 三、檢附中央健康保險署「透析前高風險腎臟病人使用 NSAIDs 藥量異常」指標定義(附件一)。
- 四、爰依上述，健保署資料分析貴會轄區西醫基層診所「透析前高風險腎臟病人使用 NSAIDs 藥量異常」在 113 年第 2 季有 83 家，98 位醫師開立名單(附件二)，爰此惠請貴會協助輔助宣導院所，對患者使用此藥物應嚴加謹慎審視，以達預防降低或延緩腎功能惡化。

正本：社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會、
屏東縣醫師公會、澎湖縣醫師公會、
1. 報知診所
2. 備查

主任委員朱光興

康維敬 9/4/2024
高雄市醫師公會
理事長朱光興 9/4/2024

裝

訂

線

附件一

「透析前高風險腎臟病人使用 NSAIDs 藥量異常」指標定義

- 一、 指標精神：符合透析前高風險腎臟病人定義，於3個月內所有使用口服 NSAIDs 藥品總日數 ≥ 31 日之案件，例：110年1-3月申報開立 NSAIDs 藥物案件，以申報資料之主次診斷碼或上傳 eGFR 值歸類判斷透析前高風險腎臟病人，並將該病人口服 NSAIDs 藥品總日數 ≥ 31 日之案件列入監測。

二、 各名詞定義：

病患 ID 歸戶如任一 ICD-10-CM 碼為透析後之主次診斷碼，則該病人歸類為透析後病人，餘符合以下慢性腎臟病第 3B 期至第 5 期病人條件，定義為透析前高風險腎臟病人：

慢性腎臟病第 3B 期病人，符合以下任一條件：

1. 資料範圍內最近一次 eGFR 值 $30 \leq eGFR < 45$ 。
2. CKD 收案者且資料範圍內最近一次 eGFR 值 $30 \leq eGFR < 45$ 。
3. PRE-ESRD 收案者且資料範圍內最近一次 eGFR 值 $30 \leq eGFR < 45$ 。

慢性腎臟病第 4 期病人，符合以下任一條件：

1. 病患以 ID 歸戶，資料範圍內任一診斷碼(ICD-10-CM)為 N18.4。
2. 資料範圍內最近一次 eGFR 值 $15 \leq eGFR < 30$ 。

慢性腎臟病第 5 期病人，符合以下任一條件：

1. 病患以 ID 歸戶，資料範圍內任一診斷碼(ICD-10-CM)為 N18.5。
2. 資料範圍內最近一次 eGFR 值 < 15 且尚未透析。

備註：

- A. 透析後診斷碼：N18.6、R88.0、Z49.01、Z49.02、Z49.31、Z49.32、

Z91.15、Z99.2。

B. 尚未透析：資料範圍未申報透析案件(案件分類 05)。

C. 資料範圍為近 3 個月內資料。

三、 口服 NSAIDs 藥品：ATC 碼前 5 碼為 M01AA、M01AB、M01AC、M01AE、M01AG、M01AH 或 ATC 碼 7 碼 M01AX01、M01AX02、M01AX07、M01AX17 且醫令代碼第 8 碼=1(口服藥)。

(一)M01AA：phenylbutazone、mofebutazone、oxyphenbutazone、clofezone、kebuzone

(二)M01AB：Acetic acid derivatives and related substances

(三)M01AC：Oxicams

(四)M01AE：Propionic acid derivatives

(五)M01AG：Fenamates

(六)M01AH：Coxibs

(七)M01AX01：nabumetone

(八)M01AX02：niflumic acid

(九)M01AX07：benzydamine

(十)M01AX17：nimesulide