

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：



高雄市政府 函

801003

高雄市前金區市中一路225號4樓

地址：802511高雄市苓雅區凱旋二路132之1號

承辦單位：衛生局

承辦人：葉祐禎(疾病管制處)

電話：07-7134000#1226

傳真：07-7131571

電子信箱：ycyeh812@kcgc.gov.tw

受文者：社團法人高雄市醫師公會

發文日期：中華民國114年6月27日

發文字號：高市府衛疾管字第11403392601號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：小心，別讓新生兒感染腸病毒衛教單張、伊科病毒11型VS一般腸病毒衛教單張、
把拔馬麻注意！新生兒腸病毒懶人包、新生兒腸病毒流行期防疫措施各乙份

主旨：因應近期腸病毒疫情持續上升，請貴院加強新生兒腸病毒防治工作，並請貴公會轉知所屬會員，請查照。

說明：

一、依據衛生福利部114年6月20日衛授疾字第1140200589號函辦理。

二、衛生福利部疾病管制署(下稱疾管署)疫情監測資料顯示，近期腸病毒疫情持續升溫，本(114)年6月26日止，累計已有8例腸病毒感染併發重症病例，為近6年同期最高，其中5例死亡。重症病例中以感染伊科病毒11型為多(共7例)，其中4例死亡，均為未滿1個月之新生兒，另1例死亡個案係感染克沙奇B5型；本年第25週(6月15日至6月21日)健保門急診腸病毒就診人次超過6千人，較前一週上升約10.7%，社區監測檢出腸病毒型別以容易造成新生兒重症之伊科病毒11型為多，顯示近期新生兒感染腸病毒及併發重症風險有增加趨勢。

三、鑒於新生兒感染病程變化迅速，應嚴加戒備，請醫療院所、產後護理機構及坐月子中心等落實相關防治作為：

(一)於孕婦產檢時，加強進行新生兒腸病毒衛教。

(二)主動詢問產婦於產前14天至分娩前後，是否有發燒或疑似感染症狀；對疑似或確定感染的新生兒與嬰兒，以及在

產前14天至分娩前後有發燒或疑似感染症狀之產婦所分娩的新生兒，皆應採取適當隔離防護措施。

(三)落實感染管制及環境清消措施並加強對醫護人員、工作人員等教育訓練。

(四)提高對腸病毒重症的警覺及應變能力，落實詢問病患之TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚），並加強院際聯繫與落實轉診機制，提升個案轉診及病床調度效率，及早提供個案妥適醫療照護，以降低後遺症與死亡風險。

四、相關感染管制、防治指引及衛教素材可逕至疾病管制署全球資訊網(www.cdc.gov.tw)/傳染病與防疫專題/傳染病介紹/第三類法定傳染病/腸病毒感染併發重症，以及疾病管制署全球資訊網「新生兒腸病毒防疫專區」下載參閱。

五、請本局健康管理科協助轉知權管產後護理機構及坐月子中心落實感染管制及防治措施，並請視疫情需求，適時提高查核頻度。

正本：本市81家醫院、社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會
副本：本市38區衛生所、本局健康管理科（均含附件）

市長 陳其邁

本案依分層負責規定授權機關首長判發

擬：1.刊網站。
2.轉知院所
胡竹君. 114.7.8.

高雄醫師公會
理事長陳金順

小心!別讓新生兒感染腸病毒!

傳染途徑



胎盤感染



產道感染



產後感染

主要病毒種類



伊科病毒



克沙奇B型病毒

常見症狀

發燒

活動力下降

喝奶量變少



重症症狀



心肌炎



肝炎



新生兒敗血症



腦炎/腦膜炎

預防方法

孕婦及新生兒盡量
不要接觸疑似病患

孕婦生產前後，應
注意自身健康狀況

照顧者要勤洗手，
做好個人衛生習慣

返家接觸孩童前，
洗手更換乾淨衣物

伊科病毒11型VS.一般腸病毒

	伊科病毒11型	一般腸病毒
傳播情形	糞口、飛沫、接觸傳染 傳染力高	
年齡分布	各年層均會感染， 新生兒較易出現重症	各年齡層均會感染， 5歲以下幼兒較易出現重症
症狀表現	發燒、活動力下降、腦膜炎	手足口病、疱疹性咽喉炎
重症	新生兒敗血症、多重器官衰竭	腦炎、心肌炎、肢體麻痺
治療方法	支持性療法	
預防方法	以肥皂勤洗手、戴口罩、產婦及家人注意自身症狀、 流行期避免新生兒與訪客、親友無防護的接觸	



把拔馬麻注意！ 新生兒腸病毒

衛生福利部疾病管制署 廣告
TAIWAN CDC



2025/06 TAIWAN CDC AD

什麼是新生兒腸病毒



出生未滿一個月的新生兒，在孕婦生產前、分娩過程（或稱周產期）或出生後人際接觸期間感染腸病毒，稱為新生兒腸病毒感染

2025/06 TAIWAN CDC AD

大多數新生兒腸病毒感染
都是輕微症狀或無症狀



中暑？

感冒？

流感？


腸胃炎？



且新生兒腸病毒感染臨床表現與
許多疾病相似，不一定會出現紅
疹、水泡或口腔潰瘍等症狀，因
此診斷有困難度


2025/06 TAIWAN CDC AD

主要病毒種類



伊科病毒

6、9、11、19、30型



克沙奇B型病毒

B1、B2、B3、B4、B5型

潛伏期

2至15天 (平均3至5天)

2025/06 TAIWAN CDC AD

傳染途徑



產道感染



胎盤感染



產後感染

2025/06 TAIWAN CDC [AD]

常見症狀

發燒

喝奶量變少

活動力下降



2025/06 TAIWAN CDC [AD]

重症表現



新生兒敗血症

發燒、肝脾腫大、貧血
嚴重時可能會發生呼吸
窘迫、休克等



心肌炎

新生兒感染克沙奇B型
，可能會併發心包膜炎
或心肌炎



腦炎/腦膜炎

躁動不安、食慾不振或
前囟門膨出，以及抽搐
、意識改變等腦炎症狀



肝炎

新生兒感染克沙奇B 1
、B 3 型病毒，有機會
出現肝炎症狀，嚴重可
能發展為猛爆性肝炎、
急性肝細胞壞死

2025/06 TAIWAN CDC [AD]

孕產婦該如何預防

產前篇



流行季節準媽媽避免出入
人潮壅擠和空氣不流通的
公共場合，並儘量不要接
觸病患



產前1 4天至分娩前後，
出現發燒、上呼吸道感染
、腹瀉、肋肌痛等症狀，
應主動告知醫師

2025/06 TAIWAN CDC [AD]

孕產婦該如何預防

產後篇



生產後如疑似感染腸病毒在症狀緩解以前，應避免母嬰同室及接觸新生兒



哺乳期間如有不適或出現疑似腸病毒症狀，應徵詢醫師是否繼續哺餵母乳，且應先與新生兒隔離

2025/06 TAIWAN CDC [AD]


照顧者該如何預防



避免對新生兒親親抱抱



家中大人小孩如身體不適，不接觸新生兒



家人、親友或醫護人員接觸或照顧新生兒前應用肥皂洗手，必要時應更衣或配戴口罩

2025/06 TAIWAN CDC [AD]

新生兒腸病毒流行期防疫措施①

如您家中有新生兒，建議：

- ➔ 儘量謝絕訪客
- ➔ 儘量謝絕親朋好友對新生兒抱抱親親
- ➔ 儘量避免讓新生兒出入人潮眾多的公共場所
- ➔ 如家人有症狀請自我隔離或做好防護，盡量不接觸新生兒
- ➔ 家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，務必以肥皂正確洗手
- ➔ 保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品
- ➔ 新生兒出現發燒、活力不佳、進食下降等症狀，應儘速送醫



2025/06/17

衛生福利部疾病管制署

新生兒腸病毒流行期防疫措施 ②

如您本身是或家中有快到預產期的孕婦，建議：

- ➔ 若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師
- ➔ 如家人有症狀請自我隔離或做好防護，盡量不接觸孕婦
- ➔ 避免出入人潮眾多的公共場所、避免接觸有症狀的人士
- ➔ 勤洗手、戴口罩，保持環境清潔



2025/06/17

衛生福利部疾病管制署